

IMPORTANT !

Identification des frelons




La colonisation du frelon asiatique s'accroît d'années en années.

Aucune région n'est épargnée.

Leur progression atteint maintenant les pays de l'Est.

En étudiant le cycle biologique de ce frelon,



on s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau.

En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants au début de l'hiver.

L'ensemble des mâles et des ouvrières ne survivent pas l'hiver et meurent.

Le nid se dégrade alors rapidement et chute au sol.

Seules les jeunes reines (fondatrices) fécondées en septembre-octobre se camouflent

dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs ou encore dans le sol, etc.

Les fondatrices n'en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter, leurs grands besoins énergétiques sont le glucose (sucre).


C'est à ce moment là que nous pouvons agir.

Disposons dans nos jardins et en ville sur nos balcons des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.

1 reine pond 2 000 à 3 000 individus...

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique, de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10cm d'un mélange composé à part égale de bière brune (ou blonde), de vin blanc (pour repousser les abeilles), du sirop de cassis ou grenadine (pas de menthe).

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril.



Changer la mixture de temps en temps
et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas
toujours morts ;
sortis du piège, ils peuvent se réveiller et s'enfuir.
Merci de votre lecture et à vos pièges !